

这是什么？

盆腔炎性疾病是子宫、输卵管和卵巢的细菌感染。这种感染可能是未经治疗的性传播感染(STI)的结果,例如衣原体或淋病。盆腔炎性疾病也可能因以下原因发生:

- 由于阴道细菌过度生长
- 产后
- 流产或插入宫内节育器等手术后

如果不及时治疗,盆腔炎性疾病可能会损害生殖器官。

家庭医生现在会做些什么？

你将进行尿液检查, 抗生素治疗, 包括注射和片剂, 而且如果需要, 还需要缓解疼痛的药物。家庭医生还可能讨论:

- 必要时检测性传播感染
- 在恢复期间停止性行为, 以及将来的安全性行为
- **如果感染是由性传播感染引起的, 进行接触者追踪** (告诉性伴侣你有性传播感染)

如果你的病情很严重或复杂, 家庭医生可能会将你转诊至专科医生。

家庭医生将来会做些什么？

家庭医生可能希望尽快再次见你, 检查你的治疗进展情况, 并讨论测试结果。如果你的病情没有改善, 家庭医生可能会建议进行另一项检查, 例如超声波检查。由于再次感染很常见, 家庭医生可能会建议在大约三个月后再次见你。

我可以问医生什么问题？

- 我需要什么治疗？
- 是什么原因导致我的盆腔炎性疾病？
- 治疗会持续多久？
- 在哪里可以获得更多帮助？



我能做些什么？

继续服用抗生素, 即使你感觉好多了。

如果你的PID是由性传播感染引起的, 你可能需要确保在过去两个月内与你发生过性关系的每个人都知道要接受检测。告诉之前的伴侣将阻止他们传播感染并鼓励他们接受治疗。

都有哪些支持？

利物浦性健康诊所为性传播感染患者提供支持和接触者追踪。如需预约, 请致电 9827 8022。

在哪里可以了解更多信息？

- 更好的健康渠道 - 盆腔炎性疾病: betterhealth.vic.gov.au
- 新州计划生育协会 - 盆腔炎性疾病: fpnsw.org.au