

这是什么？

梅毒是一种性传播感染。这是一种细菌感染，通过无保护的性行为或使用不干净的针头或未经筛检的输血传播。梅毒是通过验血确诊的。

感染开始于生殖器、直肠或口腔的无痛疮肿。然后，可能会发展成皮疹或更严重的症状。梅毒采用抗生素治疗，尽快得到治疗很重要。你还需要告诉你过去的性伴侣，以便他们能够得到治疗。

我的家庭医生现在会做些什么？

家庭医生会为你提供以下相关信息：

- 其他性传播感染的治疗和检测
- 启动**接触者追踪**程序
- 安全性行为策略、预防和避孕
- 盆腔炎等相关问题
- 资源和支持
- 是否需要转诊去见心理咨询师或专科医生

如果你有以下情况，可能需要转介至性健康专家：

- 你对青霉素过敏
- 你怀孕了
- 你的病例很复杂
- 你有另一种感染，如艾滋病

我的家庭医生将来会做些什么？

家庭医生可能会在3个月、6个月和12个月后再次与你进行进一步检测，以确保感染消失。如果你怀孕了，则需要在治疗结束五周后重新检查。

我能做些什么？

重要的是要认真遵循治疗医嘱。除了让自己变得健康，你需要确保最近与你发生过性关系的每一个人人都知道要去做检测，以防止他们传染他人。

都有哪些支持？

利物浦性健康诊所提供检测和诊断。除了帮助你进行接触者追踪以外，工作人员还可以帮助你管理和应对性感染诊断。你可以请家庭医生为你转诊，也可以直接拨打9827 8022 联系该诊所，或前往位于利物浦伊丽莎白街13号一楼的诊所。

在哪里可以了解更多信息？

如果你想了解更多有关梅毒和性健康的信息，以下资源列表可能会提供帮助：

- **澳大利亚健康热线** — 梅毒: healthdirect.gov.au
- **健康翻译资料** — 梅毒 (多语种资源): healthtranslations.vic.gov.au
- **新州性病计划小组** — 梅毒: stipu.nsw.gov.au



我可以问医生什么问题？

- 我需要服用什么药物？
- 如何防止再次感染？
- 我有并发症的风险吗？
- 我的家人和朋友会发现吗？