

这是什么？

附睾睾丸炎是睾丸和附着在每个睾丸上的输精管的疼痛肿胀，是成人的一种常见感染。可以是轻度到重度，最常见的是由尿液感染或性传播感染（STI）引起的。

家庭医生现在会做些什么？

家庭医生会询问健康史。医生会检查睾丸，查找肿胀和疼痛的可能原因。医生还可能对你进行性传播感染和其他病菌筛查。通常，治疗包括服用一个疗程的抗生素。家庭医生还可能将你转诊至性健康诊所，以帮助管控性传播感染并进行接触者追踪。

家庭医生将来会做些什么？

家庭医生将在四到五天后再次见你，确保你的症状有所好转。医生可能会讨论性传播感染筛查或其他检测结果。肿胀和疼痛可能需要几周时间才能消失。如果症状没有好转，家庭医生可能会将你转诊至专科医生。

我能做些什么？

参加家庭医生的所有随访预约。如果症状没有改善，请告知医生。与家庭医生一起完成整个抗生素疗程。如果症状没有改善，请告诉医生。即使感觉好转，也要完成整个抗生素疗程。

通过以下方式护理阴囊：

- 尽量减少体力活动
- 穿着带有柔软衬垫的紧实合身内裤
- 使用冰袋
- 服用止痛药和抗肿胀药
- 坐浴

如果患有性传播感染，则在停止治疗后7天内不应发生性行为。

我可以问医生什么问题？

- 如果我的症状发生变化怎么办？
- 什么是接触者追踪？
- 是否有任何并发症？



都有哪些支持？

Liverpool性健康诊所

Liverpool性健康诊所为性传播感染患者提供支持，并将帮助你进行接触者追踪。工作人员还可以帮助你管理和应对性传播感染。家庭医生可能会为你转诊，或者你可以自己联系该诊所。

地址：Ground Floor, 13 Elizabeth Street, Liverpool。

电话：9827 8022

如果你的病情严重或没有好转，家庭医生可能会将你转诊至私人泌尿科医生。

在哪里可以了解更多信息？

- Patient.info – 附睾睾丸炎：patient.info